



حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية



بالتعاون بين قسم طب الأسرة وكلًّا من قسم مكافحة العدوى وإدارة الخدمات الصيدلانية وإدارة التمريض وقسم التثقيف الصحي وإدارات العلاقات العامة وعلاقات المرضى والأمن ، يسراً القيام بحملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية



٢٠٢٠ - ٢٧ - ٢٩ الموافق : ١٢-١١-٢٠٢١ ربيع أول ١٤٤٢



الفترة الصباحية :
٨:٣٠ إلى ١٢:٣٠



عيادات طب الأسرة
البهو الرئيسي في المستشفى
فريق متنقل لأقسام العزل والعنایات
المركزية ووحدة العناية اليومية والطوارئ



الفئات المستهدفة :
موظفي المستشفى وذويهم
من الدرجة الأولى في القرابة



و جميع متدربي الإمتياز و مراكز
الدراسات العليا



إعداد قسم التثقيف الصحي
بالتعاون مع قسم طب الأسرة

حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية

الوقاية من المرض:

إن الطريقة الأفضل والوحيدة للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة هي بالحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام




موانعأخذ اللقاح:

هناك بعض الأشخاص الذين لا يعطى لهم اللقاح إلا بعد استشارة الطبيب، وهؤلاء هم:

- من لديهم حساسية شديدة من البيض.
- من كان لديه حساسية شديدة للقاح الإنفلونزا في وقت سابق.
- من ظهرت لديهم متلازمة غيلان باري (Guillain Barre Syndrome) في وقت سابق بعدأخذ اللقاح

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر (لم تتم الموافقة على إعطاء اللقاح لهذه الفئة)

الأشخاص اللذين لديهم ارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة ولكن يمكنهم أخذ اللقاح بعد أن تستقر لديهم درجة الحرارة



مصدر المعلومات:
وزارة الصحة

وقد تم إتاحة اللقاحات المأمونة والناجحة واستخدامها منذ ما يزيد على ٦٠ عاماً. ويمكن للقاح الإنفلونزا وقاية البالغين الأصحاء من حدوث المرض بنسبة نجاح تصل إلى ٩٠٪ كما يمكنه الإسهام في الحد من حدوث حالات مرضية شديدة أو مضاعفات بين المسنين بنسبة ٦٠٪ تقريباً

والحد من حدوث الوفاة بسبب المرض أو مضاعفاته بنسبة ٨٠٪



الآثار الجانبية للتطعيم:

يعتبر تطعيم الإنفلونزا آمناً، ولكن من الممكن أن تصاحبه بعض الأعراض الموضعية المؤقتة التي لا تزيد مدتها على 48 ساعة على أقصى تقدير، كـ:

ارتفاع طفيف
في درجة
الحرارة

آلام طفيفة
في الجسم

احمرار أو تورم
بسيط في موضع
الحقن

احتقان
في الحلق

King Abdulaziz University Hospital



Seasonal Influenza Vaccination Campaign



In collaboration with the Department of Family Medicine, the Department of Infection Control, the Department of Pharmaceutical Services, the Department of Nursing, the Department of Health Education, public relations, patient relations and security departments, we are pleased to carry out the seasonal influenza vaccination campaign



27-28-29 October 2020
10-11-12 Rab.I 1442 AH



Morning Time:
8:30 to 12:30



The main lobby of the hospital
Family medicine clinics.
Mobile teams for isolation ,
intensive care departments , the
daily care and emergency unit



Target groups :
hospital employees and
their families First class in
kinship
and All internships and
postgraduate studies



Done by: health education department
In cooperation with the Department
of Family Medicine



Seasonal influenza vaccination campaign



Contraindications to taking the vaccine:

The following groups should be vaccinated only after consulting a doctor:


Those who have severe egg allergy

Those with previous history of severe allergy to influenza vaccine.

Those with history of Guillain Barre Syndrome after taking the vaccine

Children under 6 months (vaccine is not approved for this category)

People suffering from very high or moderate temperature (they may be vaccinated after recovery)



Influenza Prevention:

The most effective way to prevent the disease and/or its severe complications is to keep taking the vaccine annually

Safe and effective vaccines are available and have been used for more than 60 years

Among healthy adults, influenza vaccine can provide up to 90% protection

the vaccine may reduce severity of disease by 60% amongst the elderly

and incidence of complications and deaths by 80%



Side effects of vaccination:

Influenza vaccination is safe, but is possible to be accompanied by some temporary, local symptoms that appear for no more than 48 hours, such as



Slight rise in temperature



Mild redness or swelling at the injection site



Minor body aches



Sore throats